


Covid-19



**Prise en charge d'un résident suspect
en établissements et services médico-sociaux**

(phase 2 du plan gouvernemental)

Ce document est susceptible d'évoluer en fonction de l'actualité

Ce document concerne la prise en charge d'un résident suspect de covid-19 en attendant son transfert pour une prise en charge hospitalière (phase 2 du plan gouvernemental).

Important

Ces recommandations évolueront lors du passage en phase 3.


COMPOSITION D'UN KIT COVID-19

- 1 affichette habillage/déshabillage
 - 1 affiche de signalisation sur la porte de la chambre
 - 4 masques chirurgicaux **EN 14683**
 - 4 charlottes
 - 4 surblouses à manche longue
 - 4 tabliers à usage unique
 - 4 paires de lunettes de protection
 - 1 flacon de SHA virucide
 - 1 boîte de gants
-
- 2 sacs DASRI (1 pour l'intérieur de la chambre, 1 pour l'extérieur)
 - 1 sac étanche pour matériel de bionettoyage
 - 1 sac hydrosoluble
 - 1 sac de linge
 - 1 sac avec gélifiant pour le recueil des selles
 - 1 bac de dépose des lunettes après usage
 - 1 flacon de détergent neutre et 1 bidon eau de javel ou un flacon de détergent –désinfectant sporicide

HABILLAGE

1. Surblouse à manches longues à usage unique + tablier plastique (si risque de projection)*
2. Masque de protection respiratoire chirurgical
3. Charlotte
4. Lunettes de protection
5. Désinfection des mains au PHA
6. Gants à usage unique*

* Si besoin



Si besoin

Si besoin

DÉSHABILLAGE

- 1- Tablier
- 2- Surblouse
- 3- Gants
- 4- Désinfection des mains au PHA



Dans la chambre



- 5- Lunettes
- 6- Charlotte
- 7- Masque
- 8- Désinfection des mains au PHA




À l'extérieur



PORT DU MASQUE CHIRURGICAL

1. Dans le bon sens (les plis vers le bas)
2. Couvrir nez, menton, bouche
3. Ajuster la barrette sur le nez
4. Jamais en collier
5. Jamais touché ni repositionné
6. Port 3 à 4 heures
7. Jeté si souillé, touché, mouillé
8. SHA avant et après



Positions correctes

En savoir plus :





Port du masque chirurgical




Arlin Midi-Pyrénées 2012

<https://www.youtube.com/watch?v=CMgDVSGWPjc>

COMMENT ENFILER LES GANTS




Ne toucher qu'une partie limitée du gant



Ne pas toucher la peau de l'avant-bras avec la main déjà gantée

COMMENT RETIRER LES GANTS



**Ôter le premier gant en pinçant au niveau du poignet
puis retourner le second gant depuis l'intérieur du poignet**

En savoir plus :

Mise en place et retrait des gants à

Usage Unique

SLIN Côte basque 2020

https://youtu.be/R0V_4NZxI0






[Télécharger l'affiche « Précautions standard »](#)

GESTION DES EXCRETA

VIGILANCE concernant la gestion des excréta !
Privilégier l'utilisation des sacs protecteurs de bassin
(à jeter dans les DASRI)



ENTRETIEN LINGE ET VAISSELLE

Gestion du linge du résident :

1. Privilégier le linge lavé au sein de la structure
2. Linge mis en sac hydrosoluble, fermé avant la sortie de la chambre
3. Lavé à 60° en 30 minutes
4. Ou à 40° en programme long si linge fragile

Entretien de la vaisselle

Respecter les procédures habituelles

ENTRETIEN DES LOCAUX

au départ du résident

Aérer la chambre 20 minutes puis procéder à l'entretien des locaux

Proscrire l'utilisation d'un aspirateur

Utiliser de préférence du matériel à usage unique à éliminer en DASRI

À défaut, privilégier du matériel réutilisable, évacué hors de la chambre dans un sac fermé (lavage à 60°C)

Produits :

Utiliser soit avec une solution d'eau de Javel à 0,5%
soit avec un produit **sporicide**

Equipement de protection individuel de l'opérateur :

- Surblouse à usage unique
- Gants de ménage

DILUTION DE L'EAU DE JAVEL



1. Nettoyage avec un détergent neutre



2. Rincage à l'eau

3. Désinfection à l'eau de javel à 0,5%, diluée à partir d'un bidon ou d'un berlingot


Eau de javel à 0,5% : solution à 2,6%, diluée au 1/5ème



1 berlingot de 0,250 litre
Eau de Javel 9,6 %



1 bidon de 1 ou 2 litres
Eau de Javel 2,6%



Puis
nouvelle
dilution

